



Klipning af mandlerne.

Operation i generel anæstesi, (fuld bedøvelse): Bedøvelsen gives af en speciallæge i anæstesi. Han henter dig og din ledsager i venteværelset og følger jer ind på operationsstuen. Bedøvelsen foregår enten ved en indsprøjtning i armen eller ved maske for ansigtet. Narkoselægen vælger den af metoderne, han mener, er bedst for dig. Under bedøvelsen får du luft gennem et rør lagt ind i dit luftrør. Det kan efterfølgende medføre kortvarig irritation i halsen. Du vågner op inde i klinikken. Her får du en is. Når du er vågen nok og det ikke bløder, kan du tage hjem. Typisk varer hele opholdet i klinikken 2 timer.

Du kan godt få lidt feber efter operationen og evt. kaste gammelt brunligt blod op. Det er normalt. Men du må **ikke kaste frisk blod op eller bløde frisk blod fra næsen/eller munden.** så skal du **straks ringe** til mig. **Det første døgn må du ikke være alene!**

Ved problemer eller spørgsmål inden for det første døgn efter operationen, kan du ringe på
Tlf.. 31705007

Klipning af mandler

Mandlerne sidder i svælgets sider og bliver delvist fjernet. Ved opdeling, bliver mandlerne hvidlige.

Efter operationen:

Det bløder en kort tid efter operationen. Du skal derfor det første døgn spise kold flydende kost (is, yoghurt, kolde supper o.l.). Du må forvente nedsat aktivitet de næste 2-3 dage.

Husk: Ved opkast af frisk blod at ringe til mig omgående.